



Kısaca Konu Başlıkları gizle

- 1 BEKUNİS nedir ve ne için kullanılır?
- 2 BEKUNİS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 - 2.1 Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
- 3 BEKUNİS nasıl kullanılır ?
- 4 Olası yan etkiler nelerdir ?
 - 4.1 Seyrek :
 - 4.2 Çok seyrek:
- 5 BEKUNİS'in saklanması

Bekunis draje kullanma talimatı bilgilerini içeren bu içerikte; bekunis draje nedir, nasıl kullanılır, ne için kullanılır şeklindeki tüm sorulara yanıt verilmiştir. Ayrıca yazı sonunda ise bekunis draje günde kaç kez kullanılır, neye iyi gelir, ne kadar kullanılır gibi bir çok soruya ve Bekunis'in her daim güncellenen fiyat bilgilerinin bulunduğu bağlantılar eklenmiştir.

BEKUNİS draje Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her draje en az 3 mg Senna meyve yaprağı ve Sennoside B formunda standartlaştırılmış hidrokiantraks türevi ve 5 mg Bisacodyl içeren ekstrakt karışımı içerir.

Yardımcı madde: Susuz sodyum sülfat, jelatin, aerosil, esma blast, talk, magnezyum stearat, susuz laktoz, eudragit L 30 D, polietilen glikol 6000, kristal şeker, akasya sakızı, tween 80, el kremi, titanyum dioksit, kalsiyum karbonat, stearik asit, sıvı glikoz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanım kılavuzunu saklayın. Lütfen daha sonra ihtiyaç halinde okuyun.

Başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyin.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza

BEKUNİS draje kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatlarda yazılanları tam olarak takip edin. İlaç hakkında size önerilen doza ek olarak yüksek veya düşük doz kullanmayın.



BEKUNİS nedir ve ne için kullanılır?

BEKUNİS 30 draje içeren blister ambalajda sunulmaktadır. BEKUNİS, bağırsak mukozasına doğrudan etki ederek, bağırsağın hareketliliğini ve içeriğinin geçiş hızını artırır, su ve elektrolitlerin salgılanmasını engeller. Bu etki ile dışkı yumuşar ve atılır. BEKUNİS, kabızlığın kısa süreli tedavisinde kullanılır.

BEKUNİS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEKUNİS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Etkin maddeye veya bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa bu ilacı kullanmayınız.

Mide bulantısı, **kusma** veya apandisit, nedeni bilinmeyen karın ağrısı, bağırsak tıkanıklığı, Krohn hastalığı, ateş, ishal gibi ülseratif kolit, karın krampları ile seyreden bağırsak bozuklukları gibi belirtiler varsa, ameliyat sonrası ve elektrolit (su ve tuz kaybı) dengesinin bozulduğu durumlarda kullanılmamalıdır.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

BEKUNİS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Uzun süreli kullanımların bağırsak tembelliğine ve su-elektrolit dengesinin bozulmasına neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bağırsak tıkanıklığı veya tanısı konmamış karın içi şikayetleri olan hastalarda kullanılmamalı ve inflamatuvar bağırsak hastalığında dikkatli kullanılmalıdır.

Şeker hastalığı (Diabetes mellitus), hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) ve kalp hastalığı olan hastalarda doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

1 haftadan fazla sürekli kullanılmamalıdır.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

BEKUNİS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Herhangi bir yiyecek veya içecek ile etkileşime girdiğine dair **bilgi** yoktur.

Hamilelik

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu PDF içerik konuanlatimi.net sitesine aittir ve farklı bir web sitesinde tıklanabilir kaynak link verilmeden paylaşılması / görüntülenmesi yasaktır.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildirin. Hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir. Diyet veya başka önlemlere rağmen kabızlık düzelmiyorsa, yalnızca hamileliğin ilk 3 ayında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

BEKUNİS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BEKUNIS laktoz ve glikoz içerir. Daha önceden doktorunuz tarafından belirli şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Potasyum eksikliği nedeniyle kalp kasını güçlendiren ilaçların (kalp glikozitleri) veya kalp ritmini düzenleyen ilaçların (antiaritmikler) etkilerini artırabilir.

İdrar söktürücüler (diüretik ilaçlar), kortikosteroidler ile birlikte kullanım artan potasyum kaybına neden olabilir.

Antasitler ve simetidin ile birlikte alınmamalıdır. Bu ilaçların uygulanmasından iki saat sonra alınabilir.

Halihazırda herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

BEKUNİS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Hekim tarafından aksi önerilmedikçe; Yetişkinler gece yatmadan önce 1 drajeyi az su ile ağızdan alırlar.

1 haftadan fazla sürekli kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Bu PDF içerik konuanlatimi.net sitesine aittir ve farklı bir web sitesinde tıklanabilir kaynak link verilmeden paylaşılması / görüntülenmesi yasaktır.

Gece yatmadan önce az su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı : 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı : Özel kullanım yok. Doktorunuza danışarak kullanınız.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği : Özel kullanım yok. doktoruna konsültasyonda kullanın.

BEKUNİS'in etkilerinin çok güçlü veya zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEKUNİS kullandıysanız

Yüksek doz kullanmanın sonuçları; Karın ağrısı (kolik) ve kramplar, şişkinlik, düşük tansiyon, baş dönmesi ve ishal gibi sindirim sistemi bozuklukları aniden ortaya çıkabilir.

BEKUNİS'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

BEKUNİS'i kullanmayı unutursanız

Kaçırılan bir dozu dengelemek için çift doz almayın.

BEKUNİS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BEKUNİS tedavisi kesildiğinde herhangi bir yan etki beklenmez.

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BEKUNİS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse, BEKUNİS'i kullanmayı bırakın ve DERHAL Doktorunuza söyleyiniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (ellerin, ayakların, ayak bileklerinin, yüzün, dudakların veya



özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi, deri döküntüsü) 'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Bunlardan birine sahipseniz, BEKUNİS'e karşı ciddi bir alerjiniz var demektir. Derhal tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir veya hastaneye kaldırılabilirsiniz.

'Bütün bu çok ciddi yan etkiler çok nadirdir.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek :

- Baş dönmesi
- Azalan kan basıncı
- Bağırsaklarda gaz şikayetleri

Çok seyrek:

- Karın ağrısı
- İshal
- İdrar rengi koyu veya kırmızımsı olur

'Bu etkiler BEKUNİS'in hafif yan etkileridir.'

Bu kullanma talimatında belirtilmeyen herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

BEKUNİS'in saklanması

- BEKUNİS'i ambalajında ve çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- 30 0C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihine kadar kullanın.

Paket üzerindeki son kullanma tarihinden sonra BEKUNİS'i kullanmayınız.
Üründe ve/veya ambalajında herhangi bir kusur fark ederseniz BEKUNİS'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467 Maslak /

Bu PDF içerik konuanlatimi.net sitesine aittir ve farklı bir web sitesinde tıklanabilir kaynak link verilmeden paylaşılması / görüntülenmesi yasaktır.

Sarıyer / İstanbul

Üretim yeri:

Roha Arzneimittel GmbH Bremen /Almanya

Ambalajlama yeri :

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt/ İstanbul

Bekunis Draje kullanıcı yorumlarına “buradan” ulaşabilir ve ilaç hakkında sormak istediğiniz soruları iletebilirsiniz.

Kaynak: <https://pdf.ilacprospektusu.com/5751-bekunis-draje-kt.pdf>